

# 知っておこう～インフルエンザ

インフルエンザと風邪は違う病気です  
インフルエンザは風邪とは全く別の病気で、症状や感染力も強く、ときに重症化して命に関わることもある感染症です。

能性があります（接触感染）。インフルエンザにかかるないようにするためにはこの2つの感染経路を断つことが大切です。

## かからぬためのポイント

1. 人混みに出るときは予防のためマスクをする。
2. 外出から帰宅したら、手洗い・うがいの徹底を心がける。アルコール入りの消毒液も有効。
3. ふだんから栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めておく。
4. インフルエンザ予防接種を受ける。

かかりぬようするためには?  
感染経路（飛沫感染、接触感染）を断ちましょう

インフルエンザは感染した人の会話や咳、くしゃみなどから放出されたしぶき（飛沫）に含まれるインフルエンザウイルスを吸い込むことで感染します（飛沫感染）。この距離は1mといわれています。また、ウイルスを含んだ飛沫は、ドアノブなど様々なものに付着しています。それらに触れた手で眼や口に触れると感染する可

	インフルエンザ	かぜ
症 状	38℃以上の発熱、せき、くしゃみなどの呼吸器症状、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感など。	微熱、くしゃみ、鼻水、のどの痛みなどの部分的症状。
経 過	急激にすむ。重症化することもある。	ゆるやかにすむ。
感染力	強い。人から人へ急速に広がる。	インフルエンザほど強くない。

## 市では 高齢者インフルエンザ予防接種 を実施しています

### ■対象者

- ①満65歳以上の方
- ②満60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器に重い病気があり身体障害者手帳1級をお持ちの方

■実施期間 12月29日(土)まで

■自己負担金 1,500円（市助成後金額）  
※一人1回のみ

◆対象者および発送時期 平成24年1月1日から9月30までの間に保険料の納付があった方には、11月中に日本年金機構より控除証明書が発送されます。なお、10月1日から12月31日までの間にはじめて保険料を納付された方については、平成25年2月中に控除証明書が発送されます。なにわんやご家族の負担すべき国民年金保険料を納付したときは、納付した方がその保険料額を申告することができます。お問い合わせは、控除証明書専用ダイヤルまでお願いします。

◆問い合わせ先 市民課 国保年金係  
（内線125・127）  
※再交付は控除証明書専用ダイヤルで申請できますが届くまで一週間ほど時間がかかりますのでご注意ください。

### 控除証明書専用ダイヤル

☎ 0570-070-117 (ナビダイヤル)  
(IP電話・PHS電話からは、03-6700-1130)

### ◆受付期間

平成24年11月1日(木)～平成25年3月15日(金)

### ◆受付時間

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分

月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付

第2土曜日：午前9時30分～午後4時

※祝日、12月29日～1月3日は、ご利用いただけません。

# 年金

だより

NENKINDAYORI

## 国民年金加入の方に 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます

平成24年中に国民年金保険料を支払った方が、確定申告または年末調整の際に社会保険料控除を受けようとする場合、国民年金保険料を納付したことと証明する書類を、申告書等に添付しなければなりません。

このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構より発行されます。

## 閉じこもり予防のためのチェック

### 健康への关心

- 1日3食、バランスに気をつけて食事をしている
- 運動や体操、散歩などで、体を動かすようにしている
- 体や歯の定期健診を受けている
- かかりつけ医がいる

### 家庭での役割

- 掃除、洗濯、食事の支度をしている
- 年金や預金などのお金を管理している
- 庭の手入れや食料品などの買い物をしている


### 社会・地域への参加

- 相談したり、相談にのったりする友人・知人がいる
- 地域の活動や催し、老人クラブに参加している
- ボランティア活動をしている
- 世の中の動きや出来事に関心があり、新聞も読んでいる

### 趣味・活動への意欲

- 取り組んでいる趣味や楽しみにしている事がある
- おしゃれに気を配っている
- 習い事をしている
- 同世代以外とも話す機会がある

\*チェックはいくつになりましたか？この4つのテーマにまんべんなくチェックが入ることが大切です。また、項目のチェックを増やしていくましょう。人や社会とのつながりが増えることにより心身の健康維持が図られます。



## 4種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）ワクチンの定期接種を開始します

### ◆対象者

生後3カ月～90カ月（7歳6カ月）までの間にある方で、原則として3種混合ワクチン・ポリオワクチンいずれも未接種の方

### ◆接種回数・接種間隔

#### 【初回接種】

20日から56日までの間隔をおいて3回皮下に注射（標準的な接種期間：生後3カ月～12カ月に達するまでの期間）

#### 【追加接種】

初回接種終了後6カ月以上の間隔をおいて1回皮下に注射（標準的な接種期間：初回接種終了後12カ月～18カ月に達するまでの期間）

### 閉じこもり予防のためのチェック

最近、「家で過ごしている方が楽…」「寒くなってきたので出かけるのがおっくう…」など感じる事はありませんか？外出する機会が減ったかなと感じたくなり予防について考えませんか？閉じこもりとは、家の外に出かける状態にもかかわらず、家中や庭先程度の外出のみで週

### ○生活習慣の見直しをしてみます。 「閉じこもり」の予防

「閉じこもり」自体は病気ではありませんが、心身の機能の低下をまねき、要介護・寝たきり状態となる場合があります。



### ◆問い合わせ先

高齢福祉課

地域包括支援センター

（えばか内） ☎ 63-2780



### ◆問い合わせ先

保健課（えばか内） 健康増進係

☎ 63-2780